

| 種類 | | 接種回数 | 間隔 | 対象年齢 | 標準的な接種期間 | 備考 |
|-------------------------|------------------------|--|-------------|----------------|---|---|
| ヒブ | 初回 | 3回 | 27日以上 | 生後2月～5歳未満 | 生後2～7月 | 接種開始年齢によって接種回数が異なる ・生後7～12月未満の場合は、初回2回、追加1回。 ・1歳～5歳未満の場合は1回。 |
| | 追加 | 1回 | 7月以上 | | 初回終了後7～13月 | |
| 小児用肺炎球菌 | 初回 | 3回 | 27日以上 | 生後2月～5歳未満 | 生後2～7月 | 接種開始年齢によって接種回数が異なる ・生後7～12月未満の場合は、初回2回、追加は初回終了後60日以上で生後12月以上に1回。 ・1～2歳未満の場合は2回、60日間以上の間隔。 ・2歳以上5歳未満の場合は1回のみ。 |
| | 追加 | 1回 | | | 生後12～15月 | |
| B型肝炎 | | 2回 | 27日以上 | 1歳未満 | 生後2～9月未満 | HBs抗原陽性の母親から生まれた児は定期接種の対象とはならない(健康保険が適用)。 |
| | | 1回 | 1回目から139日以上 | | | |
| ロタウイルス | ロタリックス | 2回 | 27日以上 | 出生6週0日後～24週0日後 | 1回目の接種は生後2か月～ 出生14週6日後まで | |
| | ロタテック | 3回 | 27日以上 | 出生6週0日後～32週0日後 | | |
| 五種混合 | 初回 | 3回 | 20日以上56日まで | 生後2月～90月未満 | 生後2月～7月 | ・5種混合ワクチンは、原則として、同一のワクチンで4回接種します(すでに、4種混合ワクチンを接種されている場合は、4種混合ワクチンとヒブワクチンを別々に接種することになります)。 |
| | 追加 | 1回 | 初回終了後6月以上 | | 初回終了後6～18月 | |
| 四種混合 | 1期初回 | 3回 | 20日以上 | 生後2～90月未満 | 生後2～12月 | |
| | 1期追加 | 1回 | 初回終了後6月以上 | | 初回終了後12～18月 | |
| 二種混合 | 2期 | 1回 | — | 11～13歳未満 | 小学6年生 | |
| BCG | | 1回 | — | 1歳未満 | 生後5～8月未満 | |
| 日本脳炎 | 1期初回 | 2回 | 6日以上 | 生後6～90月未満 | 生後6月 | |
| | 1期追加 | 1回 | 初回終了後6月以上 | | 1歳 | |
| | 2期 | 1回 | — | 9～13歳未満 | 9歳 | |
| 水痘 | | 2回 | 3月以上 | 1～3歳未満 | 生後12～15月 1回目接種後6～12月の間隔 | |
| MR (麻しん風しん) | 1期 | 1回 | — | 1歳 | — | |
| | 2期 | 1回 | — | 小学校就学前1年(年長児) | — | |
| 種類 | 接種回数 | 間隔 | 対象年齢 | 標準的な接種期間 | 備考 | |
| ヒトパピローマウイルス (HPV)感染症 | 3回 (シルガードの14歳以下は2回) | <2価(サーバリックス)> 2回目:1月以上、3回目:1回目から6月以上 | 小学6年生～高校1年生 | 中学1年生 | ワクチンによって接種間隔が異なるため、1～3回目まで同一をワクチンを使用する。 (シルガードの14歳以下は2回接種) | |
| | | <4価(ガーダシル)> 2回目:2月以上、3回目:1回目から6月以上 | | | | |
| | | <9価(シルガード)> 小6～14歳 2回目:6月以上(2回接種) 15歳以上 2回目:2月以上、3回目:1回目から6月以上 | | | | |